




	入院日	手術前日	手術当日	
			手術前	手術後
処置		必要時除毛を行ないます 夕食後、浣腸を行います		
手術	手術に必要な物品を確認します			
検査	採血があります			
薬剤・点滴	看護師、薬剤師が内服薬を確認します 16時頃、点滴を挿入します 眠れないときには眠剤をお出しします	16時頃、点滴を挿入します 眠れない時は眠剤をお出しします	朝6時頃より点滴を開始します	抗生剤の点滴があります
安静・活動・リハビリ	リハビリテーション科を受診します 車椅子操作練習と術後のスケジュールの確認を行います		リハビリはお休みです	帰室後よりベッド上安静になります ベッドを30度まで起こす事ができます
清潔	入浴できます	入浴できます		
排泄	トイレ歩行できます	トイレ歩行できます		尿の管が入ってます
食事	病院食	病院食 19時以降禁食、22時以降禁飲食です	1日禁飲食	
教育指導	トリフローの使用確認をします	トリフロー練習をします		血栓予防の為、弾性ストッキングを履き、 フットポンプを装着します
その他		医師より手術の説明があります 手術室看護師訪問、麻酔科医訪問があります		医師より手術後の説明があります

※退院日はあくまでも予定日となっています。

病状・検査・手術の経過及びご希望により短縮・延期することもありますのでご了承ください。

入院医療費の算定方法については別紙にてご説明致します。

	術後1日目	術後2日目	術後3～6日目	術後7～20日目	退院
処置				術後7日目に傷のテープをはがし、消毒します	
手術					
検査	朝、採血があります			採血とレントゲンが1週間に一回あります(退院前日に)	
薬剤・点滴	医師の指示により内服が朝から開始になります 抗生剤の点滴が2回あります(10時・20時)	抗血栓薬を朝食後内服します	抗血栓薬を朝食後内服します	抗血栓薬 (術後7日目まで)	
安静・活動・リハビリ	90度まで体を起こせます 全体重をかけ車椅子に乗る事が出来ます 午後からCPM運動を開始します	CPM運動を130度に達するまで1日2回行います	車椅子または、歩行器、杖になります	歩行が安定してきたら階段昇降の訓練をします	退院までにCPM120～130度 膝の自力屈曲100度以上を目標にします
清潔	看護師が体を拭きます			傷に問題が無ければシャワーに入れます 退院まで1日おきにシャワーのご案内をします	
排泄	尿の管が入ってます 排便時は車椅子でトイレに行きます	離床状況に応じて、尿の管を抜きます 車椅子でトイレに行きます			
食事	8時から飲水が可能となります 昼から食事が開始となります	病院食	病院食	病院食	病院食
教育指導					退院後の生活について指導します
その他		フットポンプは終了します			個人差がありますが、術後3週間後に退院になります

※退院日はあくまでも予定日となっています。

特別な栄養管理の必要性

有 無

説明日 年 月 日

病状・検査・手術の経過及びご希望により短縮・延期することもありますのでご了承ください。

入院医療費の算定方法については別紙にてご説明致します。

主治医

病棟師長

担当看護師

本人・家族