

抗凝固剤()は 月 日から内服を中止して下さい
なるべくご家族の付き添いをお願いします。
入院前は検査食、当日は何も食べてこないで下さい。

月日						
経過	当日(治療前)	当日(治療後)	当日(治療後:鎮静剤使用した場合)	当日(鎮静剤使用 ポリープ取らず退院)	当日(ポリープ取らず退院する場合)	退院
注射・内服・ 処置	午前10時頃から下剤2Lのうち、1、5Lを2時間以内に飲みます。 排便状態不良の場合はさらに0、5Lを飲みます。 その後消化管内の泡を消す薬を飲みます。 検査着に着替え、午前中から点滴を行います。 検査室入室前に検査用パンツに着替えます。	点滴は翌朝まで行います。	点滴は翌朝まで行います。	点滴は検査後目が覚めるまで行ないます。	点滴は検査が終了し病室に戻るまで行ないます。	いつも薬を飲んでいる方はいつも通り内服して下さい。
検査・治療	午前8時30分までに入院窓口にお越し下さい。 9時には病棟に入院できるようにして下さい。 いつも飲んでいるお薬がある方はお持ち下さい。 検査室に入室前にアクセサリ・化粧・義歯・湿布・貴金属を外して下さい。 入院時に、身長・体重測定、体温・血圧・脈拍・酸素飽和度の測定があります。 治療前に体温・血圧・脈拍・酸素飽和度の測定があります。	治療後体温・血圧・脈拍・酸素飽和度の測定があります。 	帰室時、帰室1時間後、帰室1時間半後(必要時)、帰室2時間後(必要時)、もしくは帰室1時間以降の覚醒時に体温・血圧・脈拍・酸素飽和度の測定があります。	左記、鎮静剤使用した場合と同様です。	検査後体温・血圧・脈拍・酸素飽和度を測ります。	午前10時頃に血圧を測ります。
安静度	病棟内の歩行は自由です。 病棟から出るときは、看護師に声をかけて下さい。 	病棟内の歩行は自由です。 病棟から出る時は、看護師に声をかけて下さい。	覚醒し血圧や呼吸状態に問題がなければ帰室1時間後までは看護師が見守りのもと歩行できます。 帰室1時間後以降は看護師がふらつきがないことを確認してから病棟内の歩行が自由になります。	左記、鎮静剤使用した場合と同様です。	病棟内の歩行は自由です。 病棟から出る時は看護師に声をかけて下さい。	病院内の歩行は自由です。
食事	朝食・昼食は禁食です。 お水は飲んでも構いません。 	夕食は禁食です。 治療2時間後、お茶とお水だけは飲んでも構いません。	治療2時間後以降覚醒したらお茶とお水だけは飲んでも構いません。 夕食は禁食です。	検査1時間後以降に覚醒したら飲水ができ、2時間後以降に覚醒したら食事ができます。 (生検している場合も同様です。)	検査1時間後より飲食ができます。 (生検している場合は1時間後以降飲水ができ、2時間後以降食事ができます。)	全粥を食べます。
清潔・排泄	病室のトイレをご利用下さい。 便にかすが混じらなくなったら、看護師にお知らせ下さい。 必要時浣腸を追加することがあります。 	病室のトイレをご利用下さい。 シャワーのご希望がある場合は看護師に声をかけて下さい。				
説明	医師、看護師から説明があります。 内服している薬がある場合は薬剤師がお部屋へ伺います。 	便に血が混じっているような場合は看護師にお知らせ下さい。	便に血が混じっているような場合は看護師にお知らせ下さい。	便に血が混じっているような場合は看護師にお知らせ下さい。 医師、看護師から説明があります。		

* 注1 病名等は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わりのるものである。

* 注2 退院日はあくまでも予定日となっています。病状・検査・手術の経過及びご希望により短縮・延期することもありますのでご了承ください。

* 注3 入院医療費の算定方法については別紙にてご説明致します。

特別な栄養管理の必要性

有 無

説明日 年 月 日

主治医

担当看護師

病棟師長

本人・家族

社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 消化器内科